

Zoönosen

Marlies Mulder, Anne Dirks, aios Medische Microbiologie, Maastricht UMC

Vraag 1

Patiënt X, bekend met een miltexirpatie in het verleden wegens een trauma, komt het ziekenhuis binnen met een fulminante septische shock. Naast petechiën aan de vingers en tenen valt op dat patiënt aan het rechteronderbeen een wondje heeft. Navraag leert dat patiënt enkele dagen geleden is gebeten door een hond. U denkt direct aan een infectie met een *Capnocytophaga canimorsus*.

Wat is de snelste methode om deze verdenking te ondersteunen?

- A. 16s PCR op volbloed
- B. Bloedkweek
- C. Direct preparaat van volbloed
- D. Wondkweek

Vraag 2

Een 71-jarige bloemist komt bij de chirurg voor het openleggen van een abces op het voorhoofd waarbij eerdere incisie en drainage onvoldoende effectief bleek te zijn. Uit het abcesvocht wordt een *Francisella tularensis* gekweekt.

Welke maatregel ten aanzien van de infectiepreventie is juist?

- A. Geen isolatie
- B. Contactisolatie
- C. Strikte isolatie
- D. Universele isolatie

Voor de antwoorden en de bespreking, zie [Antwoorden](#).

